

ਐਡਵਿਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ



ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਬਾਲਗ਼ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ: ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਡਵਿਲ ਦੀਆਂ 1 ਜਾਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜੈੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਵੋ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵਿਲ ਦੀਆਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜੈੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਵੋ। 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਐਡਵਿਲ (Children's Advil) ਵਰਤਣ।

• ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ

ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟਿਲਮੈਲੀਸਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਏ.ਐੱਸ.ਏ.) ਜਾਂ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ.ਐੱਸ.ਏ., ਸੈਲੀਸਾਈਕਲੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ਸ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡਵਿਲ (Advil) ਨਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਹਨ, ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਦਿਲ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਡਵਿਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਉ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਡਵਿਲ ਨਾ ਲਉ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਤਾਪ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਵੋ।

ਜੇ ਐਡਵਿਲ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਡ ਦਰਦ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਅਫ਼ਾਰਾ, ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ-ਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਣੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਘੁਮੇਰ ਆਉਣੀ, ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਤਰਲ ਵਧ ਜਾਣਾ, ਖਾਜ ਹੋਣਾ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਉੱਭਰ ਪੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਮਿਥੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾ ਉੱਭਰਨ।

ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜੋ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਐਸੀਟਿਲੋਟਿਓ ਮੋਨੋਗਲਿਸੇਰਾਈਡ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਮੋਮ, ਕੈਰਾਨਾਉਬਾ ਮੋਮ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾਸਤਾ, ਕ੍ਰੋਸਕਾਰਮੈਲੋਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ, ਈਥੋਕਸੀਈਥੈਨਲ, ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਲੈਸੀਥਿਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰਿਸਟੇਲਾਈਨ ਸੈਲਿਊਲੋਜ਼, ਪੈਰਾਬੈਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸ਼, ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੈੱਲੂਲੋਜ਼, ਪੈਰੀਓਨ, ਪ੍ਰੀ-ਜਿਲੈਟੀਨਾਈਜ਼ਡ ਨਸ਼ਾਸਤਾ, ਸਿਲੀਕਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਸਿਮੇਥੀਕੋਨ, ਸੋਡੀਅਮ ਬੈਂਜੋਏਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਲਾਓਰਿਲ ਸਲਫ਼ੇਟ, ਸਟੀਅਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਸਿਊਕਰਿਨ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ।

ਜੈੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜੋ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਮੱਕੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾਸਤਾ, ਕ੍ਰੋਸਕਾਰਮੈਲੋਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ, ਐੱਫ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਰੈੱਡ ਨੰਬਰ 40, ਐੱਫ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਯੈੱਲੋ ਨੰਬਰ 6, ਜੈੱਲਾਟਿਨ, ਗਲਿਸਰਿਨ, ਹਾਈਪੋਮੈਲੋਜ਼, ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਨ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸੇਰਾਈਡ, ਪ੍ਰੀ-ਜਿਲੈਟੀਨਾਈਜ਼ਡ ਨਸ਼ਾਸਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਗੈਲੇਟ, ਪ੍ਰੋਪਾਈਲਿਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਸਿਲੀਕਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਲਾਓਰਿਲ ਸਲਫ਼ੇਟ, ਸਟੀਅਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਟ੍ਰਾਈਐਸੀਟਿਨ।

ਐਡਵਿਲ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟਰੈਂਥ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ



ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਬਾਲਗ਼ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ: ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1 ਛੋਟੀ ਗੋਲੀ ਲਓ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਓ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਐਡਵਿਲ (Children's Advil) ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ

ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟਿਲਮੈਲੀਸਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਏ.ਐੱਸ.ਏ.) ਜਾਂ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ.ਐੱਸ.ਏ., ਸੈਲੀਸਾਈਕਲੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ਸ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡਵਿਲ (Advil) ਨਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਹਨ, ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਦਿਲ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਡਵਿਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਉ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਡਵਿਲ ਨਾ ਲਉ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਤਾਪ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਵੋ।

ਜੇ ਐਡਵਿਲ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਡ ਦਰਦ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਅਫ਼ਾਰਾ, ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ-ਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਣੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਘੁਮੇਰ ਆਉਣੀ, ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਤਰਲ ਵਧ ਜਾਣਾ, ਖਾਜ ਹੋਣਾ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਉੱਭਰ ਪੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਮਿਥੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾ ਉੱਭਰਨ।

ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜੋ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਮੱਕੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾਸਤਾ, ਕ੍ਰੋਸਕਾਰਮੈਲੋਜ਼ ਸੋਡੀਅਮ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਿਲਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਮੈਥਿਲਸੈਲਿਊਲੋਜ਼, ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਲੈਸੀਥਿਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੈੱਲੂਲੋਜ਼, ਪੌਲੀਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਪ੍ਰੀ-ਜਿਲੈਟੀਨਾਈਜ਼ਡ ਨਸ਼ਾਸਤਾ, ਸਿਲੀਕਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਸਿਮੇਥੀਕੋਨ, ਸੋਡੀਅਮ ਲਾਓਰਿਲ ਸਲਫ਼ੇਟ, ਸਟੀਅਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਟਾਕ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ।

ਐਡਵਿਲ ਲਿਕੂਈ ਜੈੱਲ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟਰੈਂਥ ਲਿਕੂਈ-ਜੈੱਲ



ਐਡਵਿਲ ਲਿਕੂਈ ਜੈੱਲ (200 ਮਿ.ਗ੍ਰ.) ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਬਾਲਗ਼ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ: ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸਿਰ ਦਰਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 2 ਲਿਕੂਈ-ਜੈੱਲ (Liqui-Gels) ਲਓ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 2 ਲਿਕੂਈ-ਜੈੱਲ ਲਓ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 6 ਲਿਕੂਈ-ਜੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਓ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਐਡਵਿਲ (Children's Advil) ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਡਵਿਲ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟਰੈਂਥ ਲਿਕੂਈ ਜੈੱਲਾਂ (400 ਮਿ.ਗ੍ਰ.) ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

ਬਾਲਗ਼ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ: ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1 ਐਕਸਟਰਾ ਸਟਰੈਂਥ ਲਿਕੂਈ-ਜੈੱਲ (Extra Strength Liqui-Gel) ਲਓ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1 ਐਕਸਟਰਾ-ਸਟਰੈਂਥ ਲਿਕੂਈ-ਜੈੱਲ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਬਿਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਐਕਸਟਰਾ-ਸਟਰੈਂਥ ਲਿਕੂਈ-ਜੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਲਓ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਐਡਵਿਲ (Children's Advil) ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ

ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟਿਲਮੈਲੀਸਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਏ.ਐੱਸ.ਏ.) ਜਾਂ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ.ਐੱਸ.ਏ., ਸੈਲੀਸਾਈਕਲੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ਸ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਡਵਿਲ (Advil) ਨਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਹਨ, ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਦਿਲ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਡਵਿਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਉ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਡਵਿਲ ਨਾ ਲਉ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਤਾਪ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਵੋ।

ਜੇ ਐਡਵਿਲ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਡ ਦਰਦ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਅਫ਼ਾਰਾ, ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ-ਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਣੀ, ਘਬਰਾਹਟ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਘੁਮੇਰ ਆਉਣੀ, ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਤਰਲ ਵਧ ਜਾਣਾ, ਖਾਜ ਹੋਣਾ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਉੱਭਰ ਪੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਮਿਥੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾ ਉੱਭਰਨ।

ਐਡਵਿਲ ਲਿਕੂਈ-ਜੈੱਲਾਂ (200 ਮਿ.ਗ੍ਰ.)

ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜੋ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਐੱਫ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਗਰੀਨ ਨੰਬਰ 3, ਜੈਲੇਟਿਨ, ਪੌਲੀਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਪੌਲੀਵਾਈਨਿਲ ਐਸੀਟੇਟ ਬੈਲੇਟ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਆਕਸਾਈਡ, ਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀੜਾ ਪਾਣੀ, ਸੋਰਬੀਟੋਨ, ਸੋਰਬੀਟੋਲ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ।

ਐਡਵਿਲ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟਰੈਂਥ ਲਿਕੂਈ-ਜੈੱਲਾਂ (400 ਮਿ.ਗ੍ਰ.)

ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜੋ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਜੈਲੇਟਿਨ, ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਲੈਸੀਥਿਨ, ਮੀਡੀਅਮ ਚੇਨ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸੇਰਾਈਡ, ਪੌਲੀਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਪੌਲੀਵਾਈਨਿਲ ਐਸੀਟੇਟ ਬੈਲੇਟ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਆਕਸਾਈਡ, ਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀੜਾ ਪਾਣੀ, ਸੋਰਬੀਟੋਨ, ਸੋਰਬੀਟੋਲ।

ਲਿਕੂਈ-ਜੈੱਲਜ਼ (Liqui-Gels®) ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ ਕੋਟਾਲੈਂਟ ਫਾਰਮਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ।