

## Advil 感冒和鼻竇炎膠囊及 Liqui-Gels®



### 有效成份

- 布洛芬 200 毫克
- 偽麻黃碱氫氯化物 30 毫克

### 用途

用於有效緩解感冒和鼻竇炎症狀，包括：

- 鼻塞
- 喉嚨痛
- 肢體疼痛
- 頭痛
- 鼻竇痛
- 發燒

### 服用方法

成年人及12歲以上兒童：根據需要，每隔4小時服用1粒或2粒膠囊或者液體膠粒。除非有醫生指示，否則在24小時內，不要服用超過6粒膠囊或者液體膠粒。

### • 注意事項

請置於兒童觸及不到處。此包裝內含有足以對兒童造成嚴重傷害的藥物劑量。除非有醫生指示，否則不要給12歲以下的兒童服用。

### 警告

如果您正在服用醋醯水楊酸 (ASA) 或其他含布洛芬的藥物，或者，如果您對醋醯水楊酸 (ASA)、水楊酸鹽、抗炎症藥物或其任何成份過敏，請勿服用 Advil 感冒和鼻竇炎膠囊。如果您患有腎病、肝病、糖尿病、心臟病、甲狀腺疾病、高血壓、青光眼、胃潰瘍、前列腺肥大引起的排尿困難等病症，或者，如果您正在懷孕或給嬰兒哺乳，在服用 Advil 感冒和鼻竇炎膠囊之前，請向您的醫生諮詢。如您正在或者近期曾經服用治療高血壓或抑鬱症處方藥，包括單胺氧化酶抑制劑 (MAOIs)，則您只有在醫生指導下才可服用。如果您的症狀或發燒持續5天以上，請向您的醫生諮詢。

如果您在服用 Advil 感冒和鼻竇炎藥物時，出現腹痛、噁心、嘔吐、脹滿、腹瀉、便秘、耳鳴、神經緊張、失眠、眩暈、任何視覺變化、腹水、瘙癢、皮膚濕疹或任何其他副作用或無法解釋的症狀，請立即停止服用並與醫生聯絡。萬一服用過量，即使尚未出現任何症狀，請立即致電醫生或有毒物質控制中心。


### 膠囊的非藥物成份

乙醯化單甘油脂肪酸酯、氫氧化鉍、巴西棕櫚蠟、玉米澱粉、交聯羧甲纖維素鈉、乙二醇單乙醚、氧化鐵、卵磷脂、微晶纖維素、苯甲酸酯類、制藥用光滑劑、制藥用蟲漆、聚維酮、預膠化澱粉、丙二醇、二氧化矽、二甲基矽油、苯(甲)酸鈉、十二烷基硫酸鈉、硬脂酸、蔗糖以及二氧化鈦

### 液體膠粒的非藥物成份

D&C 黃色10號、FD&C 紅色40號、分餾椰子油、凝膠、氧化鐵、聚氧乙炔、聚醋酸乙炔酞酸酯、氫氧化鉀、丙二醇、淨化水、山梨聚糖以及山梨(糖)醇

## Advil 感冒和鼻竇炎增效膠囊



### 有效成份

- 布洛芬 200 毫克
- 偽麻黃碱氫氯化物 30 毫克
- 撲爾敏 2 毫克

### 用途

用於有效緩解感冒和鼻竇炎症狀，包括：

- 鼻塞
- 鼻竇痛
- 頭痛
- 發燒
- 流鼻涕
- 打噴嚏
- 肢體疼痛
- 喉嚨痛
- 喉嚨發癢

### 服用方法

成年人及12歲以上兒童：根據需要，每隔4小時服用1粒或2粒 Advil 感冒和鼻竇炎增效膠囊。除非有醫生指示，否則24小時內不要服用超過6粒 Advil 感冒和鼻竇炎增效膠囊。

### • 注意事項

請置於兒童觸及不到處。此包裝內含有足以對兒童造成嚴重傷害的藥物劑量。除非有醫生指示，否則不要給12歲以下的兒童服用。

### 警告

如果您正在服用醋醯水楊酸 (ASA) 或其他含布洛芬的藥物，或者，如果您對醋醯水楊酸 (ASA)、水楊酸鹽、抗炎症藥物或其任何成份過敏，請勿服用 Advil 感冒和鼻竇炎增效膠囊。如果您患有腎病、肝病、糖尿病、心臟病、甲狀腺疾病、慢性肺部疾病、高血壓、青光眼、胃潰瘍、前列腺肥大引起的排尿困難等病症，或者，如果您正在懷孕或給嬰兒哺乳，在服用 Advil 感冒和鼻竇炎增效膠囊之前，請向您的醫生諮詢。如果您正在或者近期曾經服用治療高血壓或抑鬱症處方藥，包括單胺氧化酶抑制劑 (MAOIs)、其他抗組胺劑、鎮靜劑或鎮靜藥物，則只有在醫生指導下才可服用。如果您的疼痛或發燒症狀持續5天以上，請向您的醫生諮詢。此藥物可能導致困倦。服藥期間，應避免飲用含酒精飲料、駕駛汽車或操作機器。除非醫生建議，否則請勿服用超過推薦劑量的藥物。

如果在您服用 Advil 感冒和鼻竇炎增效膠囊時，出現腹痛、噁心、嘔吐、脹滿、腹瀉、便秘、耳鳴、神經緊張、失眠、眩暈、任何視覺變化、腹水、瘙癢、皮膚濕疹或任何其他副作用或無法解釋的症狀，請立即停止服用並與醫生進行聯絡。萬一服用過量，即使尚未出現任何症狀，請立即致電醫生或有毒物質控制中心。

### 非藥物成份

巴西棕櫚蠟、玉米澱粉、交聯羧甲纖維素鈉、FD&C 紅色40號、FD&C 黃色6號、山嶽酸甘油酯、羥丙甲纖維素、氧化鐵、微晶纖維素、聚葡萄糖、聚氧乙炔、預膠化澱粉、丙二醇、二氧化矽以及二氧化鈦

## Advil 感冒和鼻竇炎日用型及夜用型方便包裝



### 有效成份

- 日用型膠囊：– 布洛芬 200 毫克
- 偽麻黃碱氫氯化物30毫克
- 夜用型膠囊：– 布洛芬 200 毫克
- 偽麻黃碱氫氯化物30毫克
- 撲爾敏 2 毫克

### 用途

#### Advil 感冒和鼻竇炎日用型

用於有效緩解感冒和鼻竇炎症狀，包括：

- 鼻塞
- 鼻竇痛
- 頭痛
- 發燒
- 喉嚨痛
- 眼睛發癢，流眼淚

### 服用方法

成年人及12歲以上兒童：根據需要，每隔4小時服用1粒或2粒 Advil 感冒和鼻竇炎日用型或夜用型膠囊。除非有醫生指示，否則在24小時內總共不得服用超過6粒 Advil 感冒和鼻竇炎日用型或夜用型膠囊。

### • 注意事項

請置於兒童觸及不到處。此包裝內含有足以對兒童造成嚴重傷害的藥物劑量。除非有醫生指示，否則不要給12歲以下的兒童服用。

### 警告

如果您正在服用醋醯水楊酸 (ASA) 或其他含布洛芬的藥物，或者，如果您對醋醯水楊酸 (ASA)、水楊酸鹽、抗炎症藥物或其任何成份過敏，請不要服用。如果您患有腎病、肝病、糖尿病、心臟病、甲狀腺疾病、慢性肺部疾病、高血壓、青光眼、胃潰瘍、前列腺肥大引起的排尿困難等病症，或者，如果您正在懷孕或給嬰兒哺乳，在服用 Advil 感冒和鼻竇炎日用型或夜用型膠囊之前，請向您的醫生諮詢。如果您正在或者近期曾經服用治療高血壓或抑鬱症處方藥，包括單胺氧化酶抑制劑 (MAOIs)，則您只有在醫生指導下才可服用。Advil 感冒和鼻竇炎夜用型膠囊可能導致困倦，並且，如果您正在服用其他抗組胺劑、鎮靜劑或鎮靜藥物，請向您的醫生諮詢。服藥期間，應避免飲用含酒精飲料、駕駛汽車或者操作機器。萬一服用過量，即使尚未出現任何症狀，也應立即致電醫生或有毒物質控制中心。如果您的症狀或發燒持續5天以上，請向您的醫生諮詢。

### 日用型的非藥物成份

乙醯化單甘油脂肪酸酯、氫氧化鉍、巴西棕櫚蠟、玉米澱粉、交聯羧甲纖維素鈉、乙二醇單乙醚、氧化鐵、卵磷脂、微晶纖維素、苯甲酸酯類、制藥用光滑劑、制藥用蟲漆、聚維酮、預膠化澱粉、丙二醇、二氧化矽、二甲基矽油、苯(甲)酸鈉、十二烷基硫酸鈉、硬脂酸、蔗糖以及二氧化鈦

### 夜用型的非藥物成份

巴西棕櫚蠟、玉米澱粉、交聯羧甲纖維素鈉、FD&C 紅色40號、FD&C 黃色6號、山嶽酸甘油酯、羥丙甲纖維素、氧化鐵、微晶纖維素、聚葡萄糖、聚氧乙炔、預膠化澱粉、丙二醇、二氧化矽以及二氧化鈦