

Caplets et Liqui-Gels® Advil Rhume et Sinus



Ingrédients actifs

- 200 mg d'ibuprofène
- 30 mg de chlorhydrate de pseudoéphédrine

Son action

Pour un soulagement efficace des symptômes du rhume et de la sinusite, y compris:

- la congestion nasale
- les maux de tête
- les douleurs sinusales
- les douleurs et courbatures
- la fièvre
- les maux de gorge

Mode d'emploi

Adultes et enfants de plus de 12 ans : Prendre 1 ou 2 caplets ou Liqui-Gels toutes les 4 heures, au besoin. Ne pas prendre plus de six caplets ou Liqui-Gels par période de 24 heures sauf sur l'avis d'un médecin.

• Précaution

Garder hors de portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour incommoder gravement un enfant. Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans sauf sur l'avis d'un médecin.

Mise en garde

Les personnes prenant de l'acide acétylsalicylique (AAS) ou d'autres produits contenant de l'ibuprofène, ou qui sont allergiques à l'AAS, aux salicylates, aux médicaments anti-inflammatoires, ou à l'un des ingrédients de ce produit ne doivent pas l'utiliser. Les personnes souffrant de maladie rénale ou hépatique, de diabète, de troubles cardiaques ou thyroïdiens, d'hypertension, de glaucome, d'ulcère gastroduodénal, de difficulté à uriner en raison d'une hypertrophie de la prostate, ainsi que les femmes enceintes ou qui allaitent, doivent consulter un médecin avant de prendre Advil Rhume et Sinus. Les personnes qui prennent, ou qui ont pris récemment, des médicaments contre l'hypertension ou la dépression, incluant des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO), ne devraient prendre ce produit que selon les indications d'un médecin. Consulter un médecin si les symptômes ou la fièvre durent plus de 5 jours.

Si des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac, des nausées ou des vomissements, des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation, des tintements ou des bourdonnements dans les oreilles, de la nervosité, de l'insomnie, des étourdissements, des changements de la vision, une rétention aqueuse, des démangeaisons, des éruptions cutanées, ou tout autre effet secondaire ou symptôme inexplicable se manifestent pendant la prise d'Advil Rhume et Sinus, arrêter immédiatement de l'utiliser et consulter un médecin. En cas de surdose, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin, même en l'absence de symptômes.

Ingrédients non médicinaux (caplets)

acide stéarique, amidon de maïs, amidon prégélatinisé, benzoate de sodium, cellulose microcristalline, cire de carnauba, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium, dioxyde de titane, éthoxyéthanol, glaçage pharmaceutique, gomme laque, hydroxyde d'ammonium, laurylsulfate de sodium, lécithine, monoglycérides acétylés, oxydes de fer, parabens, povidone, propylène glycol, saccharose, siméthicone.

Ingrédients non médicinaux (Liqui-Gels)

eau purifiée, gélatine, huile de coco fractionnée, hydroxyde de potassium, jaune D&C no 10, oxyde de fer, phthalate d'acétate de polyvinyle, polyéthylène glycol, propylène glycol, rouge FD&C no 40, sorbitane, sorbitol.

Liqui-Gels® est une marque de commerce déposée ou une marque déposée de Caltent Pharma Solutions

Advil Rhume et Sinus PLUS



Active Ingredients

- 200 mg d'ibuprofène
- 30 mg de chlorhydrate de pseudoéphédrine
- 2 mg de maléate de chlorphéniramine

Son action

Pour un soulagement efficace des symptômes du rhume et de la sinusite, incluant:

- la congestion nasale
- les douleurs et courbatures
- la fièvre
- les éternuements
- les maux de tête
- l'écoulement nasal
- les douleurs sinusales
- les maux de gorge
- l'irritation de la gorge

Mode d'emploi

Adultes et enfants de plus de 12 ans : Prendre 1 ou 2 caplets toutes les 4 à 6 heures, au besoin. Ne pas prendre plus de six caplets par période de 24 heures, sauf sur l'avis d'un médecin. Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans sauf sur l'avis d'un médecin.

• Précaution

Garder hors de portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour incommoder gravement un enfant. Ne pas donner à un enfant de moins de 12 ans, sauf sur l'avis d'un médecin.

Mise en garde

Les personnes prenant de l'acide acétylsalicylique (AAS) ou d'autres produits contenant de l'ibuprofène, ou qui sont allergiques à l'AAS, aux salicylates, aux médicaments anti-inflammatoires, ou à l'un des ingrédients de ce produit, ne doivent pas l'utiliser. Les personnes souffrant de maladie rénale ou hépatique, de diabète, de troubles cardiaques ou thyroïdiens, d'affections pulmonaires chroniques, d'hypertension, de glaucome, d'ulcère gastroduodénal, de difficulté à uriner en raison d'une hypertrophie de la prostate, ainsi que les femmes enceintes ou qui allaitent, doivent consulter un médecin avant de prendre Advil Rhume et Sinus PLUS. Les personnes qui prennent, ou qui ont pris récemment, des médicaments pour l'hypertension ou la dépression, incluant des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO), d'autres antihistaminiques, des tranquillisants ou des sédatifs, ne devraient prendre ce produit que selon les indications d'un médecin. Consulter un médecin si les symptômes ou la fièvre durent plus de 5 jours. Ce produit peut causer de la somnolence. Éviter de consommer des boissons alcoolisées, de conduire un véhicule ou d'être aux commandes d'une machine. Ne pas dépasser la dose recommandée, sauf sur l'avis d'un médecin.

Si des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac, des nausées ou des vomissements, des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation, des tintements ou des bourdonnements dans les oreilles, de la nervosité, de l'insomnie, des étourdissements, des changements de la vision, une rétention aqueuse, des démangeaisons, des éruptions cutanées, ou tout autre effet secondaire ou symptôme inexplicable se manifestent pendant la prise d'Advil Rhume et Sinus PLUS, arrêter immédiatement de l'utiliser et consulter un médecin. En cas de surdose, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin, même en l'absence de symptômes.

Ingrédients non médicinaux

amidon de maïs, amidon prégélatinisé, béménate de glycéryle, cellulose microcristalline, cire de carnauba, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium, dioxyde de titane, hypromellose, jaune FD&C no 6, oxyde de fer, polydextrose, polyéthylène glycol, propylène glycol, rouge FD&C no 40.

Advil Rhume et Sinus en emballage duo Jour et Nuit



Ingrédients actifs

- Caplets pour le jour: – 200 mg d'ibuprofène – 30 mg de chlorhydrate de pseudoéphédrine
- Caplets pour la nuit: – 200 mg d'ibuprofène – 30 mg de chlorhydrate de pseudoéphédrine – 2 mg de maléate de chlorphéniramine

Son action

Advil Rhume et Sinus Jour

Pour un soulagement efficace des symptômes du rhume et de la sinusite, incluant :

- la congestion nasale
- les douleurs sinusales
- les maux de tête
- la fièvre
- les maux de gorge
- les larmoiements et les picotements des yeux
- l'écoulement nasal
- les éternuements

Advil Rhume et Sinus Nuit soulage en PLUS :

Mode d'emploi

Adultes et enfants de plus de 12 ans : Prendre 1 ou 2 caplets d'Advil Rhume et Sinus Jour et Nuit toutes les 4 heures, au besoin. Ne pas prendre plus de 6 caplets d'Advil Rhume et Sinus Jour et Nuit par période de 24 heures, sauf sur l'avis d'un médecin.

• Précaution

Garder hors de portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour incommoder gravement un enfant. Ne pas donner à un enfant de moins de 12 ans, sauf sur l'avis d'un médecin.

Mise en garde

Les personnes prenant de l'acide acétylsalicylique (AAS) ou d'autres produits contenant de l'ibuprofène, ou qui sont allergiques à l'AAS, aux salicylates, aux anti-inflammatoires ou à l'un des ingrédients de ce produit, ne devraient pas l'utiliser. Les personnes souffrant de maladie rénale ou hépatique, de diabète, de troubles cardiaques ou thyroïdiens, d'affections pulmonaires chroniques, d'hypertension, de glaucome, d'ulcère gastroduodénal, de difficulté à uriner en raison d'une hypertrophie de la prostate, ainsi que les femmes enceintes ou qui allaitent, doivent consulter un médecin avant de prendre Advil Rhume et Sinus Jour et Nuit. Les personnes qui prennent, ou qui ont pris récemment, des médicaments d'ordonnance contre l'hypertension ou la dépression, incluant des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) ne devraient prendre ce produit que selon les indications d'un médecin. Les caplets Advil Rhume et Sinus Nuit peuvent causer de la somnolence ; les personnes qui prennent d'autres antihistaminiques, tranquillisants ou sédatifs doivent consulter un médecin. Éviter de consommer des boissons alcoolisées, de conduire un véhicule motorisé ou d'opérer des machines. En cas de surdose, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin, même en l'absence de symptômes. Consulter un médecin si les symptômes ou la fièvre durent plus de 5 jours.

Ingrédients non médicinaux (Jour)

acide stéarique, amidon de maïs, amidon prégélatinisé, benzoate de sodium, cellulose microcristalline, cire de carnauba, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium, dioxyde de titane, éthoxyéthanol, glaçage pharmaceutique, gomme laque, hydroxyde d'ammonium, laurylsulfate de sodium, lécithine, monoglycérides acétylés, oxydes de fer, parabens, povidone, propylène glycol, saccharose, siméthicone.

Ingrédients non médicinaux (Nuit)

amidon de maïs, amidon prégélatinisé, béménate de glycéryle, cellulose microcristalline, cire de carnauba, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium, dioxyde de titane, hypromellose, jaune FD&C no 6, oxyde de fer, polydextrose, polyéthylène glycol, propylène glycol, rouge FD&C no 40.