

एडविल कोल्ड एण्ड साइनस गोलियां व लिक्वी-जेल्ल



सक्रिय अंश

- आइबूप्रोफेन 200मि.ग्र.
- सूडोइफेड्रीन हाईड्रोक्लोराईड 30मि.ग्र.

उपयोग

निम्नलिखित समेत जुकाम व साइनसाइटिस के लक्षणों से प्रभावशाली राहत के लिए:

- नाक बंद होना
- शरीर दर्द व शूल
- साइनस का दर्द
- गला दर्द करना
- सर दर्द
- बुखार

निर्देश

बालिग व 12 साल से अधिक आयु के बच्चे: आवश्यकता अनुसार प्रत्येक 4 घण्टे के बाद 1 या 2 छोटी गोलियां अथवा लिक्वी-जेल्ल लें। डाक्टर के कहे बिना 24 घण्टे में 6 छोटी गोलियां अथवा लिक्वी-जेल्ल से अधिक न लें।

• स्तर्क रहें

ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बच्चों के हाथ न लग सके। इस पैकेज में दवा इतनी मात्रा में है कि बच्चे को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। डाक्टर के कहे बिना 12 साल से कम आयु के बच्चों को मत दें।

चेतावनी

अगर आप ऐसिटिलसैलीसिलिक ऐसिड (ए.ऐस.ऐ.) अथवा आइबूप्रोफिन वाले कोई अन्य उत्पादन ले रहे हैं, या आपको ए.ऐस.ऐ., सैलीसाईकलेटों या सूजन कम करने वाली दवाओं से, अथवा इनके किसी अंश से ऐलर्जी हो तो एडविल कोल्ड एण्ड साइनस (Advil Cold & Sinus) न लें। अगर आपको गुरदों या जिगर की, या श्वर, दिल या थायरायड की बीमारी, खून का अधिक दबाव, काला मोतिया, पेट में अल्सर, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाने से पेशाब करने में कठिनाई हो, या आप गर्भवती हैं या बच्चे को स्तनपान कराते हैं, तो एडविल कोल्ड एण्ड साइनस लेने से पहले अपने डाक्टर से प्रामर्श कर लें। खून के अधिक दबाव या डिप्रेसन के लिए मोनोअमीन आकसीडेज-रोधक (एम.ऐ.ओ.आई.) दवाओं समेत डाक्टरों सिफारिश पर कोई दवा ले रहे या पिछले कुछ समय में दवा ले चुके व्यक्ति दवा को केवल डाक्टर के निर्देशों के अनुसार ही लें। अगर लक्षण या बुखार 5 दिन से अधिक समय के लिए रहें तो अपने डाक्टर से प्रामर्श लें।

अगर एडविल कोल्ड एण्ड साइनस लेने के दौरान पेट दर्द, छाती में जलन, उबकाई या उल्टी आना, पेट फले जैसा महसूस होना, दस्त, कब्ज, कानों में आवाज़ गुंजना, घबराहट, नींद न आना, चक्कर आना, दृष्टि में कोई परिवर्तन, तरल बंद जाना, खुजली होना, चमड़ी पर लाल निशान पड़ना, या कोई अन्य बुरा प्रभाव, या कोई ऐसे लक्षण उभरना जिनके कारणों का पता न चले तो तुरंत दवा लेना छोड़ कर किसी डाक्टर से प्रामर्श लें। अगर आवश्यकता से अधिक दवा ले लें तो एक दम से पुआयेजन कंट्रोल सेंटर या डाक्टर से संपर्क करें चाहे कोई लक्षण उभर कर सामने न भी आए।

छोटी गोलियां में ऐसे तत्व जो दवा से संबंधित न हों


ऐसिटिलेटिड मोनोग्लिसराइड, अमोनोअम हाइड्रोआक्साईड, कैरानौबा मोम, मक्की का नशास्ता, क्रीसकारमैल्लोज सोडीअम, ईथोक्सीथेनल, आयरन आक्साईड, लैसीथिन, माडीक्रोक्रिस्टैलाईन सैल्युलोज, पैराबेन, दवाओं में उपयोग की जाने वाली पालिश, दवाओं में उपयोग की जाने वाली शैल्लक, पोवीडोन, प्री-जिलैटीनाईज्ड नशास्ता, प्रोपाईलिन ग्लाइकोल, सिलीकन डाईआक्साईड, सिमैथीकोन, सोडीअम बैन्जोएट, सोडीअम लाओरिल सलफेट, स्टीअरिक ऐसिड, स्क्रूरोज, टाईटैनियम डाईआक्साईड।

लिक्वी-जेल्लों में ऐसे तत्व जो दवा से संबंधित न हों

डी. एण्ड सी. यैलो नम्बर 10, एफ.डी. एण्ड सी. रेड नम्बर 40, नारोअल का फ्रैक्सेटिड तेल, जैलेटिन, आयरन आक्साईड, पोलोइथाईलिन ग्लाइकोल, पोलोवाइनिन ऐसोटेट थैलेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साईड, प्रोपाईलीन ग्लाइकोल, शुद्ध किया जल, सोरबीट, सोरबीटॉल।

लिक्वी-जेल्ल (Liqui-Gels)® एक रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क है कैटालेन्ट फार्मा सोल्यूशंस का।

एडविल कोल्ड एण्ड साइनस प्लस



सक्रिय अंश

- आइबूप्रोफेन 200मि.ग्र.
- सूडोइफेड्रीन हाईड्रोक्लोराईड 30मि.ग्र.
- क्लोरोफेनीरामीन मैलिएट 2मि.ग्र.

उपयोग

निम्नलिखित समेत जुकाम व साइनसाइटिस के लक्षणों से प्रभावशाली राहत के लिए:

- नाक बंद होना
- बुखार
- शरीर दर्द व शूल
- साइनस का दर्द
- नाक बहना
- गले का दर्द
- सर दर्द
- छीके आना
- गले में खुजली

निर्देश

बालिग व 12 साल से अधिक आयु के बच्चे: आवश्यकता अनुसार प्रत्येक 4 घण्टे के बाद 1 या 2 छोटी गोलियां एडविल कोल्ड एण्ड साइनस प्लस (Advil Cold & Sinus PLUS) लें। अगर डाक्टर ने न कहा हो तो 24 घण्टे में एडविल कोल्ड एण्ड साइनस प्लस की 6 छोटी गोलियां से अधिक न लें।

• स्तर्क रहें

ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बच्चों के हाथ न लग सके। इस पैकेज में इतनी मात्रा में दवा है कि बच्चे को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। अगर डाक्टर ने न कहा हो तो 12 साल से कम आयु के बच्चों को मत दें।

चेतावनी

अगर आप ऐसिटिलसैलीसिलिक ऐसिड (ए.ऐस.ऐ.) अथवा आइबूप्रोफिन वाले कोई अन्य उत्पादन ले रहे हैं या आपको ए.ऐस.ऐ., सैलीसाईकलेटों या सूजन कम करने वाली दवाओं से, अथवा उनके किसी अंश से ऐलर्जी हो तो एडविल कोल्ड एण्ड साइनस प्लस न लें। अगर आपको गुरदों या जिगर की, या श्वर, दिल या थायरायड की बीमारी है, फेफड़ों की चिरकालिक बीमारी, खून का अधिक दबाव, काला मोतिया, पेट में अल्सर, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाने से पेशाब करने में कठिनाई हो, या अगर आप गर्भवती हैं या बच्चे को स्तनपान कराती हैं, तो एडविल कोल्ड एण्ड साइनस प्लस लेने से पहले अपने डाक्टर से प्रामर्श कर लें। खून के अधिक दबाव या डिप्रेसन के लिए मोनोअमीन आकसीडेज रोधक (एम.ऐ.ओ.आई.), अन्य एण्टी-हिस्टेमाईनज, शांतकारी या स्थिर कर देने वाली दवाओं समेत डाक्टरों सिफारिश पर कोई दवा ले रहे या पिछले कुछ समय में दवा लेते रहे व्यक्तियों को दवा केवल डाक्टर के निर्देशों के अनुसार ही लेनी चाहिए। अगर लक्षण या बुखार 5 दिन से अधिक समय के लिए रहें तो अपने डाक्टर से प्रामर्श लें।

अगर एडविल कोल्ड एण्ड साइनस प्लस लेने के दौरान पेट दर्द, छाती में जलन, उबकाई या उल्टी आए, पेट फूलने जैसा महसूस हो, दस्त, कब्ज, कानों में आवाज़ गुंजे, घबराहट हो, नींद न आए, चक्कर आए, दृष्टि में कोई परिवर्तन हो, तरल बंद जाए, खुजली हो, चमड़ी पर लाल निशान पड़े, या कोई अन्य बुरा प्रभाव या ऐसे लक्षण उभरें जिनके कारणों का पता न हो तो तुरंत दवा लेना छोड़ कर किसी डाक्टर से प्रामर्श लें। आवश्यकता से अधिक दवा लिए जाने पर एक दम से पुआयेजन कंट्रोल सेंटर या डाक्टर से संपर्क करें बेशक कोई लक्षण उभर कर सामने न भी आए।

ऐसे तत्व जो दवा से संबंधित न हों

कैरानौबा मोम, मक्की का नशास्ता, क्रीसकारमैल्लोज सोडीअम, एफ.डी. एण्ड सी. रेड नम्बर 40, एफ.डी. एण्ड सी. यैलो नम्बर 6, फिलमरल बैहीनेट, हाईपरमैल्लोज, आयरन आक्साईड, माडीक्रोक्रिस्टैलाईन सैल्युलोज, पौलीडेक्सटोस, पौलीइथाईलीन ग्लाइकोल, प्री-जिलैटीनाईज्ड नशास्ता, प्रोपाईलिन ग्लाइकोल, सिलीकन डाईआक्साईड, टाईटैनियम डाईआक्साईड।

एडविल कोल्ड एण्ड साइनस दिन व रात्रि के समय का सुविधाजनक पैक



सक्रिय अंश

दिन के समय की छोटी गोलियां

- आइबूप्रोफेन 200मि.ग्र.
- सूडोइफेड्रीन हाईड्रोक्लोराईड 30मि.ग्र.

रात्रि के समय की छोटी गोलियां

- आइबूप्रोफेन 200मि.ग्र.
- सूडोइफेड्रीन हाईड्रोक्लोराईड 30मि.ग्र.
- क्लोरोफेनीरामीन मैलिएट 2मि.ग्र.

उपयोग

एडविल कोल्ड एण्ड साइनस दिन के समय के लिए:

निम्नलिखित समेत जुकाम व साइनसाइटिस के लक्षणों से प्रभावशाली राहत के लिए:

- नाक बंद होना
- बुखार
- नाक बहना
- साइनस का दर्द
- गला दर्द करना
- छीके आना
- सर दर्द
- आंखों में खुजली, पानी बहना

निर्देश

बालिग व 12 साल से अधिक आयु के बच्चे: आवश्यकता अनुसार प्रत्येक 4 घण्टे के बाद दिन अथवा रात्रि के समय की एडविल कोल्ड एण्ड साइनस (Advil Cold & Sinus Daytime या Nighttime) की 1 या 2 छोटी गोलियां लें। अगर डाक्टर ने न कहा हो तो किसी भी 24 घण्टे की अवधि में दिन अथवा रात्रि के समय की एडविल कोल्ड एण्ड साइनस की कुल 6 छोटी गोलियां से अधिक न लें।

• स्तर्क रहें

ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बच्चों के हाथ न लग सके। इस पैकेज में इतनी मात्रा में दवा है कि बच्चे को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। अगर डाक्टर ने न कहा हो तो 12 साल से कम आयु के बच्चों को मत दें।

चेतावनी

अगर आप ऐसिटिलसैलीसिलिक ऐसिड (ए.ऐस.ऐ.) अथवा आइबूप्रोफिन वाले कोई अन्य उत्पादन ले रहे हैं, या आपको ए.ऐस.ऐ., सैलीसाईकलेटों या सूजन कम करने वाली दवाओं से, अथवा उनके किसी अंश से ऐलर्जी हो तो उपयोग न करें। अगर आपको गुरदों या जिगर, श्वर, दिल या थायरायड की बीमारी, फेफड़ों की चिरकालिक बीमारी, खून का अधिक दबाव, काला मोतिया, पेट में अल्सर, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाने से पेशाब करने में कठिनाई हो, या अगर आप गर्भवती हैं या बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो दिन अथवा रात्रि की एडविल कोल्ड एण्ड साइनस लेने से पहले अपने डाक्टर से प्रामर्श करें। खून के अधिक दबाव या डिप्रेसन के लिए मोनोअमीन आकसीडेज रोकने वाली (एम.ऐ.ओ.आई.) दवाओं समेत डाक्टरों सिफारिश पर कोई दवा ले रहे या पिछले कुछ समय में दवा ले चुके व्यक्ति दवा को केवल डाक्टर के निर्देशों के अनुसार ही लें। रात्रि के समय की एडविल कोल्ड एण्ड साइनस छोटी गोलियां से नींद आ सकती है और अगर आप हिस्टेमाईन-विरोधी, शांतकारी अथवा स्थिर कर देने वाली अथवा दवाएं ले रहे हैं तो अपने डाक्टर से प्रामर्श लें। मदिरा वाले पेय पदार्थ पीने, गाड़ी अथवा मशीनरी चलाने से बचें। आवश्यकता से अधिक दवा लिए जाने पर एक दम से पुआयेजन कंट्रोल सेंटर को फोन करें चाहे कोई लक्षण न भी प्रकट हों। अगर लक्षण या बुखार 5 दिन से अधिक समय के लिए रहें तो अपने डाक्टर से प्रामर्श करें।

दिन के समय की दवा में ऐसे तत्व जो दवा से संबंधित न हों

ऐसिटिलेटिड मोनोग्लिसराइड, अमोनोअम हाईड्रोआक्साईड, कैरानौबा मोम, मक्की का नशास्ता, क्रीसकारमैल्लोज सोडीअम, ईथोक्सीथेनल, आयरन आक्साईड, लैसीथिन, माडीक्रोक्रिस्टैलाईन सैल्युलोज, पैराबेन, दवाओं में उपयोग की जाने वाली पालिश, दवाओं में उपयोग की जाने वाली शैल्लक, पोवीडोन, प्री-जिलैटीनाईज्ड नशास्ता, प्रोपाईलिन ग्लाइकोल, सिलीकन डाईआक्साईड, सिमैथीकोन, सोडीअम बैन्जोएट, सोडीअम लाओरिल सलफेट, स्टीअरिक ऐसिड, स्क्रूरोज, टाईटैनियम डाईआक्साईड।

रात्रि के समय की दवा के ऐसे तत्व जो दवा से संबंधित न हों

कैरानौबा मोम, मक्की का नशास्ता, क्रीसकारमैल्लोज सोडीअम, एफ.डी. एण्ड सी. रेड नम्बर 40, एफ.डी. एण्ड सी. यैलो नम्बर 6, फिलमरल बैहीनेट, हाईपरमैल्लोज, आयरन आक्साईड, माडीक्रोक्रिस्टैलाईन सैल्युलोज, पौलीडेक्सटोस, पौलीइथाईलीन ग्लाइकोल, प्री-जिलैटीनाईज्ड नशास्ता, प्रोपाईलिन ग्लाइकोल, सिलीकन डाईआक्साईड, टाईटैनियम डाईआक्साईड।